

Syke barn og barnehage - retningslinjer fra Folkehelse

27.10.2005

På Legevakten får vi ofte spørsmål om når syke barn må være hjemme fra barnehagen. På grunn av smittefare har Folkehelse kommet med anbefalinger om dette. Hovedregelen er at febersyke barn og barn med redusert allmenntilstand skal holdes hjemme. Nedenfor følger en oversikt over når barn forøvrig kan gå i barnehagen ved forskjellige sykdommer. Er du i tvil, kontakt behandlende lege.

Atypiske mykobakterier:	Allmenntilstanden avgjør, ingen spesielle restriksjoner.
Amøbeinfeksjon:	Dagen etter igangsatt behandling og symptomfrihet.
Brennkopper:	Hvis utslettet kan tildekkes: Dagen etter igangsatt behandling. Hold barnet hjemme hvis utslettet ikke er under kontroll.
Bronkitt:	Allmenntilstanden avgjør, ingen spesielle restriksjoner.
Diaré:	Avhengig av om det er funnet en årsak eller ei. Må avtales med legen.
Erytema infectiosum (5.barnesykdom):	Kan gå hvis allmenntilstanden er god, uavhengig av utslett.
Forkjølelse:	Allmenntilstanden avgjør, ingen spesielle restriksjoner.
Fotsopp:	Ingen restriksjoner.
Halsbetennelse:	Hvis streptokokkbakterier er årsaken - minst 1 døgn etter at behandling er igangsatt. Hvis det ikke er streptokokker - ingen restriksjoner.
Hepatitt A:	Avtales med legen i hvert enkelt tilfelle (smitteverntiltak).
Hodelus:	Dagen etter at behandling er igangsatt.
Hånd- fot- og munnsyke:	Kan gå hvis allmenntilstanden er god, uavhengig av utslett.
Kikhoste:	Avtales med legen i hvert enkelt tilfelle (smitteverntiltak). Vanligvis 5 dager etter igangsatt behandling.
Kusma:	Avtales med legen i hvert enkelt tilfelle (smitteverntiltak). Vanligvis 9 dager etter at hevelsen startet.
Lungebetennelse:	Allmenntilstanden avgjør, ingen spesielle restriksjoner.
Mark/ormesykdommer:	Dagen etter at behandling er igangsatt.
Meslinger:	Avtales med legen i hvert enkelt tilfelle (smitteverntiltak). Vanligvis 4 dager etter utbrudd av utslett.
Mollusker:	Ingen restriksjoner.
Ringorm:	Dagen etter at behandling er igangsatt.
Røde hunder:	Avtales med legen i hvert enkelt tilfelle (smitteverntiltak). Vanligvis 1 uke etter utbrudd av utslett.
Skabb:	Dagen etter at behandling er igangsatt.
Skarlagensfeber:	Minst 1 døgn etter at behandling er igangsatt.
Tredagersfeber (4.barnesykdom, exanthema subitum):	Kan gå hvis allmenntilstanden er god, uavhengig av utslett.
Urinveisinfeksjon:	Allmenntilstanden avgjør, ingen spesielle restriksjoner.
Vannkopper:	Når utslettet har tørket inn så det ikke væsker lengre.
Vorter:	Ingen restriksjoner.
Ørebetennelse:	Allmenntilstanden avgjør, ingen spesielle restriksjoner.
Øyekatarr:	Dagen etter at behandling er igangsatt. Ikke alle trenger antibiotika.